

Los signos que a continuación se exponen están tomados de la revisión clínica de 310 individuos realizada por Jackson y colaboradores (1993) con el soporte de la Cornelia de Lange Syndrome Foundation.

<b>HIPERTRICOSIS</b>	<b>OBSERVACIONES/EXPLORADOS</b>	<b>%</b>
<b>Hirsutismo</b>	<b>231/196</b>	<b>78</b>
<b>Linea del pelo posterior baja</b>	<b>273/296</b>	<b>92</b>
<b>Sinofridia</b>	<b>304/310</b>	<b>99</b>
<b>Pestañas largas</b>	<b>307/310</b>	<b>99</b>

<b>FACIALES</b>	<b>OBSERVACIONES/EXPLORADOS</b>	<b>%</b>
<b>Anomalías oculares</b>	<b>103/181</b>	<b>57</b>
<b>Puente nasal ancho y deprimido</b>	<b>250/301</b>	<b>83</b>
<b>Nares antevertidas</b>	<b>270/308</b>	<b>88</b>
<b>Filtro largo</b>	<b>290/308</b>	<b>94</b>
<b>Labios finos</b>	<b>289/308</b>	<b>94</b>
<b>Angulos bucales hacia abajo</b>	<b>289/309</b>	<b>94</b>
<b>Tine azulado peri-ocular-oral-nasal</b>	<b>167/285</b>	<b>56</b>
<b>Dientes muy espaciados</b>	<b>217/253</b>	<b>86</b>
<b>Paladar alto y arqueado</b>	<b>249/291</b>	<b>86</b>
<b>Implantación baja de las orejas</b>	<b>172/246</b>	<b>70</b>
<b>Barbilla pequeña</b>	<b>258/306</b>	<b>84</b>
<b>Cuello corto</b>	<b>199/300</b>	<b>66</b>

<b>MIEMBROS</b>	<b>OBSERVACIONES/EXPLORADOS</b>	<b>%</b>
<b>Superiores malformados</b>	<b>84/310</b>	<b>27</b>
<b>Manos y pies pequeños</b>	<b>231/303</b>	<b>93</b>
<b>Limitación extensión codos</b>	<b>185/290</b>	<b>64</b>
<b>Implantación proximal pulgares</b>	<b>179/250</b>	<b>72</b>
<b>Clinodactilia 5° dedos manos</b>	<b>186/252</b>	<b>74</b>
<b>Surco palmar transverso</b>	<b>143/280</b>	<b>51</b>

<b>único</b>		
<b>Pterigión entre 2°-3° dedos pies</b>	<b>258/301</b>	<b>86</b>

<b>OTROS</b>	<b>OBSERVACIONES/EXPLORADOS</b>	<b>%</b>
<b>Criptorquidia</b>	<b>94/129</b>	<b>73</b>
<b>Genitales pequeños</b>	<b>73/129</b>	<b>57</b>
<b>Cutis marmorata</b>	<b>179/263</b>	<b>60</b>
<b>Ombliigo pequeño</b>	<b>124/235</b>	<b>53</b>
<b>Grito de tono bajo</b>	<b>214/288</b>	<b>74</b>
<b>Mamilas separadas</b>	<b>164/301</b>	<b>55</b>